

平成29年度特定健診・特定保健指導集計結果 主な項目の標準化該当比

市町村別

岩手県市町村国保(33保険者)、健康保険組合(2保険者)、共済組合(3保険者)、全国健康保険協会(岩手県居住者)の平成29年度特定健診結果を居住市町村に振り分けて、標準化該当比を算出した。

性別年齢構成が市町村により異なることを補正する目的で、標準化死亡比(SMR)の計算方法に準じて「標準化該当比」(SMR)を算出した。

岩手県を100として、標準化該当比が100より大きい場合は出現率が岩手県より高く、100より小さい場合は出現率が岩手県より低いことを示す。

受診者が少ない場合、その偶然的要素によって変動するため、標準化該当比の95%信頼区間についても算出した。

今回は次の4段階に区分した。

「SMR<100」かつ「信頼区間の上限<100」の時・・・有意に低い	■
「SMR<100」かつ「信頼区間の上限 \geq 100」の時・・・低いが有意ではない	■
「SMR>100」かつ「信頼区間の下限 \leq 100」の時・・・高いが有意ではない	■
「SMR>100」かつ「信頼区間の下限>100」の時・・・有意に高い	■



※「有意に高い」とは、当該市町村の標準化該当比が岩手県(100)に比べて高いということが95%以上の確率で正しいことを示す。



掲載項目一覧

- 1 メタボリックシンドローム該当者・予備群
- 2 肥満者（BMI25以上）
- 3 正常高値血圧、高血圧の者
- 4 LDLコレステロール120mg/dL以上の者
- 5 HbA1c 5.6%以上の者
- 6 現在、たばこを習慣的に吸っている者
- 7 1回30分以上の軽く汗をかく運動を週2日以上、1年以上実施している者
- 8 日常生活において歩行又は同等の身体活動を1日1時間以上実施している者
- 9 就寝前の2時間以内に夕食をとることが週3回以上ある者
- 10 夕食後に間食（3食以外の夜食）をとることが週に3回以上ある者
- 11 朝食を抜くことが週3回以上ある者
- 12 お酒（清酒、焼酎、ビール、洋酒など）を毎日飲む者

（附録）市町村別地図


- 1 メタボリックシンドローム該当者・予備群
- 2 正常高値血圧、高血圧の者
- 3 HbA1c 5.6%以上の者
- 4 現在、たばこを習慣的に吸っている者
- 5 お酒（清酒、焼酎、ビール、洋酒など）を毎日飲む者






岩手県=100

市町村別 正常高値血圧、高血圧の者の標準化該当比と95%信頼区間(男性)




岩手県=100

市町村別 正常高値血圧、高血圧の者の標準化該当比と95%信頼区間(女性)




岩手県=100

市町村別 LDLコレステロール120mg/dL以上の者の標準化該当比と95%信頼区間(男性)




岩手県=100

市町村別 LDLコレステロール120mg/dL以上の者の標準化該当比と95%信頼区間(女性)




岩手県=100

市町村別 HbA1cが5.6%以上の者の標準化該当比と95%信頼区間（男性）




岩手県=100

市町村別 HbA1cが5.6%以上の者の標準化該当比と95%信頼区間（女性）




岩手県=100

市町村別 現在、たばこを習慣的に吸っている者の標準化該当比と95%信頼区間(男性)




岩手県=100

市町村別 現在、たばこを習慣的に吸っている者の標準化該当比と95%信頼区間(女性)




岩手県=100

市町村別 1回30分以上の軽く汗をかく運動を週2日以上、1年以上実施している者の標準化該当比と95%信頼区間(男性)




岩手県=100

市町村別 1回30分以上の軽く汗をかく運動を週2日以上、1年以上実施している者の標準化該当比と95%信頼区間(女性)




岩手県=100

市町村別 日常生活において歩行又は同等の身体活動を1日1時間以上実施している者の標準化該当比と95%信頼区間(男性)




岩手県=100

市町村別 日常生活において歩行又は同等の身体活動を1日1時間以上実施している者の標準化該当比と95%信頼区間(女性)




岩手県=100

市町村別 就寝前の2時間以内に夕食をとることが週3回以上ある者の
標準化該当比と95%信頼区間(男性)




岩手県=100

市町村別 就寝前の2時間以内に夕食をとることが週3回以上ある者の
標準化該当比と95%信頼区間(女性)




岩手県=100

市町村別 夕食後に間食をとることが週に3回以上ある者の標準化該当比と95%信頼区間(男性)




岩手県=100

市町村別 夕食後に間食をとることが週に3回以上ある者の標準化該当比と95%信頼区間(女性)




岩手県=100

市町村別 朝食を抜くことが週3回以上ある者の標準化該当比と95%信頼区間(男性)




岩手県=100

市町村別 朝食を抜くことが週3回以上ある者の標準化該当比と95%信頼区間(女性)




岩手県=100

市町村別 お酒を毎日飲む者の標準化該当比と95%信頼区間(男性)




岩手県=100

市町村別 お酒を毎日飲む者の標準化該当比と95%信頼区間(女性)




平成29年度 メタボリックシンドローム該当者・予備群 標準化該当比（岩手県=100）

【男性】




【女性】




赤：岩手県の出現率より有意に高い ピンク：岩手県の出現率より高いが有意ではない
 青：岩手県の出現率より有意に低い 水色：岩手県の出現率より低いが有意ではない

平成29年度 正常高値血圧、高血圧の者 標準化該当比（岩手県=100）

【男性】




【女性】




赤：岩手県の出現率より有意に高い ピンク：岩手県の出現率より高いが有意ではない
 青：岩手県の出現率より有意に低い 水色：岩手県の出現率より低いが有意ではない

平成29年度 HbA1c5.6%以上の者 標準化該当比（岩手県=100）

【男性】




【女性】




赤: 岩手県の出現率より有意に高い ピンク: 岩手県の出現率より高いが有意ではない
 青: 岩手県の出現率より有意に低い 水色: 岩手県の出現率より低いが有意ではない

平成29年度 現在、たばこを習慣的に吸っている者 標準化該当比（岩手県=100）

【男性】




【女性】




赤: 岩手県の出現率より有意に高い ピンク: 岩手県の出現率より高いが有意ではない
 青: 岩手県の出現率より有意に低い 水色: 岩手県の出現率より低いが有意ではない

平成29年度 お酒を毎日飲む者 標準化該当比（岩手県=100）

【男性】



【女性】



赤: 岩手県の出現率より有意に高い ピンク: 岩手県の出現率より高いが有意ではない
 青: 岩手県の出現率より有意に低い 水色: 岩手県の出現率より低いが有意ではない